

SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
TTYT TX HOÀI NHƠN

Số: /TB-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hoài Nhơn, ngày tháng 05 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v Danh mục thuốc chia liều năm 2024-2025

Kính gửi: Các Khoa, Phòng, Trạm Y tế

Căn cứ thông tư 23/TT-BYT ngày 10 tháng 06 năm 2011 của Bộ Y tế quy định về hướng dẫn sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh;

Căn cứ Quyết định 61/QĐ-TTYT ngày 26 tháng 01 năm 2024 về việc ban hành Danh mục thuốc hóa dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc Y học cổ truyền năm 2024 - 2025 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn.

Qua rà soát Danh mục thuốc năm 2024 – 2025 của đơn vị, Khoa Dược thông báo đến các Khoa, Phòng, trạm Y tế Danh mục thuốc chia liều cần theo dõi bảo quản, sử dụng đúng quy định (*chi tiết tại phụ lục kèm theo*).

Nhận được thông báo này, đề nghị các Khoa, Phòng, trạm Y tế thực hiện việc sử dụng, bảo quản thuốc theo đúng khuyến cáo của nhà sản xuất.

Xin trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo TTYT;
- Đăng tải trang TTĐT của TTYT Hoài Nhơn;
- Lưu: VT, KD.

GIÁM ĐỐC

Trần Hữu Vinh

DANH MỤC THUỐC CHIA LIỀU NĂM 2024 -2025

(Kèm theo Thông báo số / TB-TTYT ngày tháng 05 năm 2024 của TTYT thị xã Hoài Nhơn)

TT	Tên hoạt chất	Tên Thuốc/ Hàm lượng/Nồng độ	Đường dùng, dạng dùng	Quy cách	Điều kiện bảo quản
1. THUỐC GÂY TÊ, GÂY MÊ, THUỐC GIÃN CƠ, GIẢI GIÃN CƠ					
1.1. Thuốc gây tê, gây mê					
1	Lidocain	LIDOCAIN 10% 38g	Phun mù	Hộp 1 lọ 38g	Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C. Sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ lúc mở
2	Sevoflurane	Sevoflurane 100% (tt/tt)	Dạng hít	Chai nhôm 250ml	Bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C. Sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ lúc mở
2. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN					
2.1. Thuốc nhóm macrolid					
3	Erythromycin + Tretinoin	ERYLIK 4% + 0,025%	Bôi ngoài da	Hộp 1 ống nhôm 30g	Bảo quản ở nhiệt độ không quá 25°C. hạn sử dụng 24 tháng kể từ ngày sản xuất
2.2 Thuốc nhóm quinolon					
4	Ciprofloxacin	Ciprofloxacin 0,3%/5ml	Nhỏ mắt	Hộp 20 lọ 5ml	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ lúc mở
5	Levofloxacin	LEVOFOXAXIME 0,5%/5ml	Nhỏ mắt	Hộp 1 lọ 5ml	Bảo quản không quá 30°C. Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày
6	Moxifloxacin (dưới dạng moxifloxacin hydroclorid) + Dexamethason phosphat (dưới dạng dexamethason natri phosphat)	Dexamoxi (5mg/ml + 1mg/ml)/5ml	Nhỏ mắt	Hộp 1 ống 5ml	Bảo quản không quá 30°C. Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày

7	Moxifloxacin (Dưới dạng Moxifloxacin hydrochlorid)	Moxieye (5 mg/ml)/10 ml	Nhỏ mắt	Hộp 1 lọ 10ml	Bảo quản không quá 30°C. Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày
8	Ofloxacin	Ofloxacin 0,3% / 5ml	Nhỏ mắt	Hộp 20 lọ 5ml	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ lúc mở
2.3. Thuốc chống vi rút khác					
9	Aciclovir	Acyclovir 3%/5g	Tra mắt	Hộp 1 tuýp 5 gam	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ lúc mở
10	Aciclovir	Acyclovir 5%/5g	Dùng ngoài	Hộp 1 tuýp 5gam	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ lúc mở
2.4. Thuốc chống nấm					
11	Ketoconazol	A.T Ketoconazole 2%/5g	Dùng ngoài	Hộp 1 tuýp 5g	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ lúc mở
12	Miconazol nitrat	Micomedi 12%/ 15g	Dùng ngoài	Hộp 01 tuýp 15g	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 15 ngày kể từ lúc mở
3. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH DA LIỄU					
13	Acid fusidic + Betamethason	FUCIPA – B (2% + 0,1%)/10g	Dùng ngoài	Hộp 1 tuýp 10g	Nhiệt độ bảo quản dưới 30 độ C
4. THUỐC TÂY TRỪNG VÀ SÁT KHUẨN					
14	Povidone Iodine	Iodine (10g/100ml)/125ml	Dùng ngoài	Hộp 1 chai 125ml	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ lúc mở nắp
15	Povidone Iodine	Iodine (10g/100ml)/30ml	Dùng ngoài	Hộp 1 chai 30ml	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 60 ngày kể từ lúc mở nắp
5. THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA					

16	Simethicon	Espumisan L 40mg/ml	Uống	Hộp 1 lọ 30ml có nắp nhỏ giọt	Bảo quản không quá 30°C, Sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ lúc mở nắp
6. HOCMON VÀ CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG VÀO HỆ THỐNG NỘI TIẾT					
6.1. Hocmon thượng thận và những chất tổng hợp thay thế					
17	Beclometason dipropionat	Satarex 0,1% (50mcg/liều)/150 liều	Xịt mũi	Hộp 1 lọ 150 liều 50 mcg	Bảo quản không quá 30°C
18	Betamethason dipropionat	Hemprenol 0,064%/20g	Dùng ngoài	Hộp 1 tuýp 20g	Bảo quản không quá 30°C
6.2. Insulin và nhóm thuốc hạ đường huyết					
19	Insulin người tác dụng nhanh, ngắn	Scilin R 400IU/10ml	Tiêm	Hộp 01 lọ 10 ml	Bảo quản thuốc ở nhiệt độ 2 – 8°C. Không làm đông lạnh thuốc, tránh ánh sáng. Sử dụng trong vòng 28 ngày sau khi mở nắp và bảo quản ở nhiệt độ không quá 25°C
20	Insulin người tác dụng trung bình, trung gian	Scilin N 400IU/10ml	Tiêm	Hộp 01 lọ 10 ml	Bảo quản thuốc ở nhiệt độ 2 – 8°C. Không làm đông lạnh thuốc, tránh ánh sáng. Sử dụng trong vòng 28 ngày sau khi mở nắp và bảo quản ở nhiệt độ không quá 25°C
21	Insulin Human (rDNA) (isophane insulin crystals) + Insulin Human (rDNA) (soluble fraction)	Mixtard 30 (700IU + 300IU)/10ml	Tiêm	Hộp 1 lọ x 10ml	Bảo quản thuốc ở nhiệt độ 2 – 8°C. Không làm đông lạnh thuốc, tránh ánh sáng. Sử dụng trong vòng 28 ngày sau khi mở nắp và bảo quản ở nhiệt độ không quá 25°C
22	Insulin người (30% insulin hòa tan + 70% insulin isophan)	Humulin 30/70 Kwikpen 300IU/3ml	Tiêm	Hộp 5 bút tiêm chứa sẵn thuốc x 3ml (15 kim kèm theo)	Bảo quản thuốc ở nhiệt độ 2 – 8°C. Không làm đông lạnh thuốc, tránh ánh sáng. Sử dụng trong vòng 28 ngày sau khi mở nắp và bảo quản ở nhiệt độ không quá 25°C

7. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH MẮT, TAI MŨI HỌNG					
23	Indomethacin	Indocollyre 0,1%	Nhỏ mắt	Hộp/ 1 lọ 5ml	Bảo quản không quá 30°C. Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày
24	Natri clorid	Seatrimaxi 0,45g/50ml	Xịt mũi	Hộp 1 lọ 50ml	Đựng trong chai nút kín, để nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C, tránh ánh sáng
25	Natri clorid	NATRI CLORID 0,9%/10ml	Nhỏ mắt, nhỏ mũi	Hộp 1 lọ 10ml	Bảo quản không quá 30°C. Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày
26	Natri hyaluronat	Hylaform 0,1%	Nhỏ mắt	Hộp 1 ống x 5ml	Bảo quản không quá 30°C. Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày
8. THUỐC TÁC DỤNG TRÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP					
8.1. Thuốc chữa ho					
27	Ambroxol hydrochlorid	Olesom 30mg/5ml	Uống	Hộp 1 chai 100ml	Bảo quản không quá 30°C. Lọ thuốc đã mở không dùng quá 30 ngày
Tổng công: 27 khoản					